

Zalecane postępowanie w celu zapobiegania pozostałościom leków w mleku



Ogólne zalecenia

Zalecenia dotyczące diagnostyki i leczenia schorzeń krów powinny być podane przez lekarza weterynarii i zamieszczone w planie ochrony zdrowia stada. Lekarz weterynarii prowadzący stado przepisze zabiegi terapeutyczne, gdy są one wymagane. Leki nie wymienione w planie nie powinny być stosowane.

Należy dołożyć wszelkich starań, aby ograniczyć stosowanie antybiotyków w gospodarstwie w celu zmniejszenia ryzyka ich pozostałości w produktach żywnościowych pochodzenia zwierzęcego.

Czy protokół leczenia przewiduje stosowanie leków?

NIE

Podjęcie działań nie jest konieczne

TAK

Leki należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza weterynarii:

1. Przed podaniem leku należy oznaczyć zwierzę, które ma go otrzymać.
2. Należy dokonać rejestracji leczenia w książce leczenia stada, podając datę każdego podania leku, numer identyfikacyjny krowy, nazwę użytego leku, numer partii leku, podaną dawkę i datę zakończenia okresu karencji (wymóg ustawowy).
3. Należy umieścić wykaz wszystkich leczonych krów w dobrze widocznym miejscu, np. na tablicy do notatek w hali udojowej.
4. Należy pamiętać, że nowo zakupione krowy mogły być wcześniej leczone bez naszej wiedzy.

Czy to leczenie wymaga zastosowania okresu karencji na mleko?

NIE

Należy postępować zgodnie z instrukcją stosowania leku

TAK

Począs trwania okresu karencji nie wolno zdawać mleka leczonych krów do zbiornika zbiorczego.

Zgodnie ze wskazaniami w ulotce leku.

Poza wskazaniami w ulotce leku.

Lekarz weterynarii prowadzący stado może zalecić stosowanie leku poza jego zatwierdzonymi wskazaniami. W tym przypadku lekarz zaleci wymagany okres karencji, który wynosi minimalnie 7 dni dla mleka i 28 dni dla mięsa. Dobra praktyka to badanie mleka w kierunku pozostałości stosowanych leków przed rozpoczęciem zdawania do zbiornika zbiorczego.

Należy upewnić się, że leki zostały nabyte z legalnych źródeł. Należy upewnić się, że okres karencji związany ze stosowaniem leków jest znany i ściśle przestrzegany.

- Jeśli zachodzi podejrzenie obecności pozostałości antybiotyków w mleku, należy niezwłocznie skontaktować się z nabywcą mleka.
- Należy przez cały czas przestrzegać informacji podanych w ulotce leku oraz zaleceń lekarza weterynarii. Leczenie przy użyciu leku poza jego oficjalnymi wskazaniami (niezarejestrowane kombinacje produktów leczniczych, odmienne niż zalecane dawki, zmieniony sposób podawania leku, zmieniona częstotliwość podawania dawki lub przedłużony czas leczenia) wywiera wpływ na okres karencji. Tylko lekarz weterynarii może zdecydować, czy lek może być stosowany w sposób odmienny od zarejestrowanego.
- Jeśli pozostałości leku wykryto w mleku zwierząt leczonych zgodnie z zaleceniami w ulotce i instrukcjami lekarza weterynarii, należy to zgłosić do lekarza weterynaryjnej, firmy, której produkt został użyty oraz do wydziału SARSS Dyrekcji Medycyny Weterynaryjnej (<http://www.vmd.defra.gov.uk/adversereactionreporting/>).

Unikanie przypadkowego dostania się pozostałości leków do mleka podczas udoju.

Czy krowy leczone i krowy w okresie karencji są dojone razem z resztą stada?

NIE

1. Krowy te powinny być dojone w ostatniej kolejności.
2. Upewnij się, że przewody systemu udoju są odłączone od zbiornika zbiorczego i podłączone do odpowiedniego osobnego zbiornika na mleko brakowane.
3. Upewnij się, że wszystkie zwierzęta są wyraźnie oznakowane na wypadek ucieczki.
4. Dokładnie umyj sprzęt udojowy z zastosowaniem detergentu i zdezynfekuj halę udojową przed kolejnym użyciem.

TAK

Czy krowy leczone są oznakowane w sposób łatwo widoczny dla dojarza?

NIE

Należy użyć co najmniej 2 metody identyfikacji, np. taśmę na ogon, pasek na nogę.

TAK

Czy mleko od krów leczonych zdajane jest z zastosowaniem osobnej linii dla mleka brakowanego lub do zbiornika z osobnym kolektorem?

NIE

Dojąc leczone krowy stosuj albo oddzielną linię dla mleka brakowanego, albo pojemnik z oddzielnym kolektorem i zdajaj takie krowy jako ostatnie.

TAK

Należy upewnić się, że całe wybrakowane mleko jest zbierane i usuwane w odpowiedni sposób. Mleko pochodzące od krów leczonych antybiotykami NIE POWINNO być podawane cielętom.

Należy przestrzegać instrukcji producenta dotyczącej liczby dawek, odstępu pomiędzy dawkami, wielkości dawek i okresu karencji, chyba że lekarz weterynarii zaleci inaczej.
W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem weterynarii, który może zalecić właściwy okres karencji i/lub przeprowadzenie odpowiedniego testu na obecność pozostałości antybiotyków.



Ten plakat jest dostępny również w innych językach.
W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę o wysłanie e-maila na adres: office@cattilevet.co.uk.

Procedury specyficzne dla krów zasuszonych

Wraz z lekarzem weterynarii należy dokonać przeglądu planu ochrony zdrowia stada i ustalić procedurę zasuszania krów.

Czy ta krowa potrzebuje okresu zasuszenia z użyciem antybiotyków?

NIE

Zasuszenie krowy należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi określonymi w planie ochrony zdrowia stada.

TAK

Czy zasuszona zostaje właściwa krowa?

NIE

Oddziel i oznakuj właściwe krowy i rozpocznij okres zasuszenia po ich ostatnim doju.

TAK

Czy okres karencji dla leku, który masz zamiar zastosować w zasuszeniu pokrywa się z prawdopodobną długością okresu zasuszenia?

NIE

Skonsultuj się z lekarzem weterynarii prowadzącym stado.

TAK

Czy oznakowano wszystkie krowy zasuszone leczone antybiotykami?

NIE

Należy użyć co najmniej 2 metody identyfikacji, które utrzymują się przez cały okres zasuszenia, np. taśmę na ogon, pasek na nogę.

TAK

Czy leczenie zostało zapisane w książce leczenia stada?

NIE

Należy wpisać datę, nazwę użytego leku, numer partii, numer identyfikacyjny krowy i datę zakończenia okresu karencji.

TAK

Należy sprawdzić, czy zapisano datę, kiedy można ponownie rozpocząć dojenie mleka do zbiornika zbiorczego.

NIE

Należy przeczytać zalecenia producenta i zapisać najwcześniejszą datę, kiedy można rozpocząć dojenie mleka do zbiornika zbiorczego. Zachowaj obowiązkowy 96-godzinny okres karencji po wycieleniu.

TAK

Czy krowy zasuszone są trzymane oddzielnie od krów dojonych, również podczas wypasu stada?

NIE

Krowy zasuszone należy trzymać oddzielnie, aby ograniczyć ryzyko ich przypadkowego doju i aby zapewnić zaspokojenie ich specyficznych potrzeb utrzymania i żywienia.

TAK

Należy zawsze przestrzegać całkowitego okresu karencji leku stosowanego w zasuszeniu, bez względu na to kiedy krowa się wycieliła. Dobra praktyka to badanie mleka w kierunku pozostałości antybiotyków przed rozpoczęciem zdawania do zbiornika zbiorczego. Należy pamiętać, że nowo nabyte krowy i jałówki mogły być wcześniej leczone bez naszej wiedzy.